

Kolonoskopie – endoskopické vyšetření tlustého střeva.

Slouží k vyšetření a drobným diagnostickým i terapeutickým výkonům v průběhu v průběhu celého tlustého střeva. Lze odebírat bezbolestně kousky sliznice (biopsie), odstraňovat polypy (polypektomie). Vyšetření není příjemné, proto v naší ordinaci podáváme před vyšetřením všem pacientům analgesiaci - léky proti bolesti (Dolsin, inj.) a na zklidnění (Dormicum inj.) přímo do žíly. Vnímání nepříjemných pocitů je u každého pacienta individuální, vzájemnou spoluprací se dá vyšetření dobře zvládnout.

Po aplikaci analgesie nesmí pacient řídit auto po dobu 8 hodin. Proto je vhodný doprovod pacienta po vyšetření.

Doba trvání je individuální v rozmezí 15-45 minut.

Příprava před kolonoskopií

5 dní před kolonoskopií vysadit ze stravy potraviny se slupkami a hrubými zrny - celozrnné pečivo, luštěniny, ovoce / hrozny, rybíz, angrešt, meloun.../, zeleninu / kukuřici, rajčata, salátové okurky, dýně... /, mák...

1 den před kolonoskopií:

Snídaně: ovocná přesnídávka + banán, káva, čaj.

Oběd: čirý vývar v jakémkoliv množství (bez masa, zeleniny, těstovin či zavářky)

Odpoledne a večer: kromě projímadla i dostatek tekutin. Ty jsou povoleny a vyžadovány **až do začátku samotné kolonoskopie.**

Příprava projímadlem se liší podle času Vašeho vyšetření.

Termín kolonoskopie do 10.00 hodin, tzv. NEDĚLENÁ PŘÍPRAVA – projímadlo a tekutiny pijete dle rozpisu večer před vyšetřením.

17.00 - 18.00 h. - **1. dávka projímadla** naředěná vodou (celkem 0,5 l., pomalu popíjet)

18.00 - 19.00 h. - **1. litr tekutin** (voda, čaj, minerálky, jablečný džus, pivo)

19.00 - 20.00 h. - **2. dávka projímadla** naředěná vodou

20.00 - 21.00 h. - **2. litr tekutin**

Termín kolonoskopie po 10.00 hodině, tzv. DĚLENÁ PŘÍPRAVA – 1. polovina (dávka) projímadla se požije večer před vyšetřením.

17.00 – 18.00 h. - **1. dávka projímadla** naředěná vodou

18.00 – 19,00 h. - **1. litr tekutin**

Druhá polovina projímadla v den vyšetření

5,00 – 6,00 h. – **2. dávka projímadla**

6,00 – 7.00 h. - **2. litr tekutin**

Projímadlo i tekutiny popíjejte pomalu, přibližně 250 ml. za 15 minu. Zabráňte tím zvracení!

Ráno, v den vyšetření požit svoji pravidelnou chronickou medikaci, kromě léků na cukrovku.

Vysazení léků na ředění krve- viz. doporučení níže